



Cantharellus cibarius



Regno: *Fungi*

Famiglia: *Cantharellaceae*

Divisione: *Basidiomycota*

Genere: *Cantharellus*

Classe: *Basidiomycetes*

Specie: *Cantharellus cibarius*

Ordine: *Cantharellales*

Caratteristiche morfologiche

Cappello: 2-12 cm, carnoso e sodo, convesso poi appianato, imbutiforme con depressione più o meno accentuata al centro. Margine irregolarmente ondulato e incurvato. Colore giallo-uovo più o meno carico fino quasi al biancastro, virante al rossastro dopo il tocco

Imenoforo: Sono delle costolature simili alle lamelle, molto decorrenti, concolori al cappello, simili a pliche e venosità della superficie inferiore del cappello

Gambo: 3-8 × 0,7-2 cm. Più o meno cilindrico, alle volte attenuato verso il basso, pieno, liscio, concolore al cappello.

Carne: Bianca o leggermente giallastra che scurisce

arrossendo al taglio. Odore fruttato. Sapore gradevolmente amarognolo e leggermente piccante, a volte con l'età assume il sapore del fieno.

Microscopia: Spore 8-10 × 4-7 μm, ellittiche, giallo pallide.

Habitat: Fungo molto comune, ma anche molto ricercato. Cresce sia nei boschi di conifere che latifoglie, dal livello del mare fino ai 2000 metri di altezza. Lo si trova dal mese di maggio fino a novembre. Fungo simbiote di moltissime piante, legato a particolari condizioni di acidità del terreno.

Note: Di questo fungo esistono diverse varietà riferite a forma e colore. È il fungo di più facile digeribilità, perché povero di micosina

Commestibilità

Ottimo commestibile