

Clitocybe odora



Regno: **Fungi**

Famiglia: **Tricholomataceae**

Divisione: **Basidiomycota**

Genere: **Clitocybe**

Classe: **Basidiomycetes**

Specie: **Clitocybe odora**

Ordine: **Agaricales**

Caratteristiche morfologiche

Cappello: 4-8 cm, carnoso, prima campanulato poi piano o depresso, verde-azzurro, sbiancante con l'età; poco igrofano, quasi liscio, opaco; margine revoluto poi ondulato.

Imenoforo: Lamelle larghe, fitte, annesse o leggermente decorrenti, più chiare del cappello, con il filo intero concolore.

Gambo: 4-8 x 0,5-1 cm, cilindrico, flessuoso, liscio, più pallido del cappello, con resti di micelio alla base.

Carne: verde pallida, con forte odore di anice e gusto analogo.

Microscopia: Spore 6-8 × 4-5,5 µm, elissoidali con base ottusa, lisce, cianofile. presenti Giunti a fibbia.

Habitat: dall'estate all'autunno, anche inoltrato. A gruppi più o meno numerosi, nei boschi di latifoglie e di conifere. Molto diffusa ovunque e piuttosto comune.

Note: L'odore forte di anice si esalta con la cottura per cui bisogna stare attenti alle quantità da inserire in un misto. In cucina quindi si usano di solito solo dei pezzetti. Sapendo dosare bene la quantità alcuni riescono a fare con la *Clitocybe odora* un gelato buonissimo dal gusto anisato.

Commestibilità

Commestibile